

MOMENTO DI APPLICAZIONE:

Il prodotto deve essere usato solo nell'ambito di un programma integrato di controllo della varroa. Applicare il prodotto su nido singolo o doppio di arnie Langstroth standard o equivalenti con almeno 6 telaini del nido coperti da api (circa 10.000 api). Le temperature esterne diurne massime devono essere comprese tra 10 e 29,5 °C il giorno del trattamento.


AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE APPLICAZIONE:

Estrarre con cautela le due strisce di prodotto dalla bustina tagliandone un'estremità; sollevare quindi l'involucro in modo che la plastica si stacchi dalle strisce e tagliare l'involucro per l'intera lunghezza della bustina. Separare le strisce con cautela. **NON RIMUOVERE GLI INVOLUCRI DI CARTA.**

Nel caso di alveari con singolo nido, adagiare le due strisce sopra i montanti dei favi della camera di covata, posizionandole in modo che siano adagiate piatte lungo l'intera larghezza del corpo d'arnia, a circa 5 cm di distanza l'una dall'altra e con i bordi delle strisce a 10 cm dal bordo delle camere di covata.

Nel caso di arnie con due camere di covata, collocare le strisce come descritto sopra sui montanti dei favi della camera di covata inferiore, in modo che le strisce si trovino tra le due camere di covata.

L'applicazione corretta delle strisce per arnia per 4 configurazioni di arnia è illustrata di seguito nei pittogrammi:



Effettuare la posa dei melari se necessario, per fornire spazio sufficiente per l'espansione di colonie forti o se si prevede importazione nettariana. È possibile usare l'escludiregina. Gli ingredienti/eccipienti principali della formulazione sono zucchero e amido alimentare, con un involucro di carta biodegradabile/compostabile. Non è necessario rimuovere le strisce dall'arnia dopo il periodo di applicazione di 7 giorni, perché le api rimuovono le strisce utilizzate. Se le strisce vengono rimosse dall'operatore, smaltirle mediante compostaggio.

TEMPO DI ATTESA

Miele: Zero giorni.

Non raccogliere il miele durante i 7 giorni di trattamento.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura inferiore a 25 °C; proteggere dalla luce solare diretta; conservare in un luogo asciutto; tenere la vaschetta di polipropilene ermeticamente chiusa, per proteggere dalla contaminazione o da fuoriuscite del prodotto. Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso, in un'area ben ventilata, lontano da acido solforico, agenti ossidanti forti (es. acido nitrico, perossidi, perclorati, cloriti) e fonti di ignizione.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore (bustina): usare immediatamente.

AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Non disturbare la colonia durante il trattamento.

Le colonie necessitano di adeguata ventilazione durante il trattamento.

T trattare tutte le colonie dell'apiario simultaneamente. Monitorare le colonie di api regolarmente per determinare il livello di infestazione da varroa. Seguire quanto indicato nelle raccomandazioni locali per il trattamento se disponibili. Il prodotto deve essere usato solo nell'ambito di un programma integrato di controllo della varroa.

Per garantire un'efficacia sufficiente, il prodotto deve essere usato quando la temperatura esterna supera i 10 °C.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Le strisce possono essere utilizzate durante l'importazione nettariana, mettere i melari se si prevede una importazione nettariana anticipata per garantire adeguato spazio alla colonia. Non disturbare la colonia per 7 giorni.

Temperature: il giorno del trattamento la temperatura esterna diurna massima deve essere compresa tra 10 e 29,5 °C. Temperature superiori a questo intervallo nei primi tre giorni di trattamento possono provocare un'eccessiva mortalità della covata e la perdita dell'ape regina. Se tali temperature coincidono con un periodo di scarso raccolto (carenza di importazione nettariana), esiste un alto rischio di perdita della regina, sua sostituzione o ritardo nella deposizione delle uova. Il trattamento deve essere rinviato quando la temperatura ambientale scende o riprende il flusso nettarifero.

Le colonie devono essere adeguatamente areate durante il trattamento. Per l'areazione deve essere garantita una apertura pari all'intera larghezza dell'arnia come la porticina d'ingresso. La porticina dell'arnia deve essere completamente aperta (tutta la larghezza dell'arnia e un'altezza minima di 1,3 cm)

per l'intera durata del trattamento (7 giorni). I riduttori della porticina devono essere rimossi, per evitare danni eccessivi alle colonie. Disturbare l'attività della colonia il meno possibile durante il trattamento.

Le colonie devono possedere buone scorte alimentari al momento del trattamento e non devono essere alimentate durante il trattamento.

Non distruggere le celle reali che si potrebbero osservare prima o dopo il trattamento. La sostituzione della regina, anche se conseguenza del trattamento, è un processo naturale e deve essere consentito per la salute della colonia. Verificare che nella colonia sia presente la regina un mese dopo il trattamento. Non è raro che dopo il trattamento siano presenti contemporaneamente sia la regina madre che la figlia.

È previsto che la colonia possa aumentare il numero di telaini occupati per ventilare i vapori del prodotto durante i primi 3 giorni di trattamento; si può osservare la formazione di 'barba'.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Quando si maneggia e si applica il prodotto indossare i normali indumenti protettivi per apicoltura. Avere acqua immediatamente disponibile.

In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e rivolgersi ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Evitare il contatto con la pelle indossando guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN 374). In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare immediatamente la pelle esposta con acqua e rivolgersi ad un medico se l'irritazione persiste. Evitare l'inalazione dei vapori. Aprire il contenitore del prodotto e scartare le strisce solo all'aperto, nella direzione del vento. In caso di inalazione accidentale, spostare l'infortunato all'aria aperta e rivolgersi ad un medico se l'irritazione persiste.

Tenere i bambini a debita distanza durante l'applicazione del prodotto.

Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione e l'applicazione del prodotto. Lavarsi sempre le mani con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non usare contemporaneamente con altri acaricidi contro la varroasi.